



Kala- ja äyriäislajien punainen lista (huhtikuu 2008)

Tämä lista käsittää kauppojen hyllyillä ja pakastealtaissa olevia lajeja, joiden kannat ovat tällä hetkellä niin heikkoja tai niiden pyynnin aiheuttama haitta meriympäristölle niin vakava, että lajien myyminen tulisi välittömästi lopettaa.

Suomenkielinen nimi	Tieteellinen nimi	Huomioita ja tarkennuksia
Ankerias	<i>Anguilla anguilla</i>	Kanta on lähellä romahdusta. Verrattuna 1980-luvun tilanteeseen aikuiseksi kasvavien poikasten määrä on vähentynyt 99 %.
Hait ja rauskut	<i>Selachimorpha</i> ; <i>Batoidea</i> (ylälahkoja)	Hait ja rauskut ovat hidaskasvuisia eivätkä siksi kestä kovaa pyyntipainetta.
Troolattu keisarihummeri	<i>Nephros norvegicus</i>	Tavallista hummeria pienempi; pyydetään troolilla, joka aiheuttaa suuria sivusaaliita sekä vahingoittaa merenpohjaa.
Norjasta pyydetty hummeri	<i>Homarus gammarus</i>	Tavallinen hummeri on uhanalainen Norjassa.
Ruijanpallas ja grönlanninpallas	<i>Hippoglossus hippoglossus</i> , <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Useimmat kannat ovat liikakalastettuja; joidenkin kantojen koosta ei ole olemassa tietoa. Pohjatroolataan, jolloin merenpohja vahingoittuu ja suuria määriä uhanalaisia syvän meren lajeja joutuu sivusaaliiksi.
Merikrotti	<i>Lophius piscatorius</i>	Kasvaa hitaasti ja sen takia kannat ovat herkkiä kalastukselle. Tieto kantojen määrästä on vajavaista.
Troolattu punakampela	<i>Pleuronectes platessa</i>	Punakampelaa kalastetaan usein puomitroolilla, joka on tuhoisin kaikista kalastusmetodeista.
Miekkakalat sekä purjekalat kuten marliinit	<i>Xiphias gladius</i> ; <i>Istiophoridae</i> - lajit kuten <i>Tetrapturus belone</i>	Useimmat kannat ovat liikakalastettuja ja uhanalaisia; sivusaaliin määrä on suuri.
Tonnikalat (pyyntitavasta riippuen myös boniitti)	<i>Thunnus albacares</i> & <i>al.</i>	Useimmat kannat ovat liikakalastettuja, ja sivusaaliiksi joutuu mm. merikilpikonnia.
Turska	<i>Gadus morhua</i>	Kannat Itämeressä ja Pohjanmeressä ovat törkeästi liikakalastettuja; kalastetaan usein pohjatroolilla.
Trooppiset katkaravut (useita lajeja)	<i>Penaeus monodon</i> , <i>Litopenaeus vannamei</i> & <i>al.</i>	Viljelykset tuhoavat ympäröivää luontoa, ja toukkia hankittaessa syntyy paljon sivusaalista.
Meriantura eli kielikampela	<i>Solea solea</i>	Useat kannat ovat liikakalastettuja ja niitä kalastetaan usein tuhoisalla puomitroolilla.
Puna-ahven eli punasimppu	<i>Sebastes marinus</i> , <i>Sebastes mentella</i>	Käytännössä katsoen kaikki kannat ovat liikakalastettuja.
Atlantin villilohi	<i>Salmo salar</i>	Monet Atlantilla elävät kannat ovat ennätysellisen alhaisia.